

**ΤΑΞΗ:** Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
**ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:** ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
**ΜΑΘΗΜΑ:** ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

**Ημερομηνία: Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018**  
**Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες**

## ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

### ΘΕΜΑ Α

**A1.** Απόδειξη σχολικού βιβλίου σελίδα 114.

**A2.** (α) Ψευδής

(β) Για τις συναρτήσεις  $f(x) = x - |x|$ ,  $g(x) = x + |x|$  με  $A_f = A_g = \mathbb{R}$  ισχύει

$$f(x) \cdot g(x) = (x - |x|) \cdot (x + |x|) = x^2 - |x|^2 = 0 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

όμως καμία από τις συναρτήσεις δεν είναι μηδενική.

**Σημείωση:** Το παραπάνω αποτελεί ένα αντιπαράδειγμα που τεκμηριώνει το ψευδές της πρότασης και προφανώς δεν είναι το μοναδικό.

**A3. 1. (α)**

**Εξήγηση:**

Η  $f(x) = e^{x-2} + 2$ ,  $x \in \mathbb{R}$  έχει αντίστροφη την  $f^{-1}(x) = \ln(x-2) + 2$ ,  $x > 2$  διότι:

$$f(x) = y \Leftrightarrow e^{x-2} + 2 = y \Leftrightarrow e^{x-2} = y - 2 \stackrel{y > 2}{\Leftrightarrow} x - 2 = \ln(y - 2) \Leftrightarrow x = \ln(y - 2) + 2$$

**2. (γ)**

**Εξήγηση:**

$$f(x) = 3^{x^2} = e^{\ln 3^{x^2}} = e^{x^2 \ln 3}$$

$$f'(x) = \left( e^{x^2 \ln 3} \right)' = e^{x^2 \ln 3} \left( x^2 \ln 3 \right)' = 3^{x^2} \cdot 2x \ln 3$$

3. (β)

Εξήγηση

Από τα δεδομένα της εκφώνησης η  $f$  ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος ενδιαμέσων τιμών.

Άρα για οποιονδήποτε αριθμό ανάμεσα στα  $f(-1), f(1)$  στην προκειμένη περίπτωση τον αριθμό  $\pi$  υπάρχει ένα τουλάχιστον  $x_0 \in (-1, 1)$  ώστε  $f(x_0) = \pi$

Α4. 1.ΣΩΣΤΟ 2.ΛΑΘΟΣ 3.ΛΑΘΟΣ 4.ΣΩΣΤΟ

## ΘΕΜΑ Β

Β1. Εφόσον η  $f$  συνεχής στο  $\mathbb{R}$  θα είναι συνεχής και στο  $x = 3$  δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x - 12}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 4)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 4) = 7$$

$$\bullet f(3) = k^2 - 2k + 8$$

Επομένως

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) \Leftrightarrow k^2 - 2k + 8 = 7 \Leftrightarrow k^2 - 2k + 1 = 0 \Leftrightarrow (k - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow k = 1$$

Άρα

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x - 12}{x - 3}, & x \neq 3 \\ 7, & x = 3 \end{cases}$$

$$\text{Για } x \neq 3 \text{ έχουμε } f(x) = \frac{x^2 + x - 12}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 4)}{x - 3} = x + 4$$

Για  $x = 3$  ισχύει:  $f(3) = 7$  και εφόσον η  $f$  συνεχής θα έχουμε  $f(x) = x + 4$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$

**B2.** Το πεδίο ορισμού της  $h \circ f$  αποτελείται από εκείνα τα  $x \in A_f$  για τα οποία  $f(x) \in A_h$

Δηλαδή:  $x \in \mathbb{R}$  και  $0 \leq x + 4 \leq 1 \Leftrightarrow -4 \leq x \leq -3$

Οπότε  $A_{f \circ h} = [-4, -3]$  και  $(h \circ f)(x) = h(f(x)) = (x + 4)^{2017} + (x + 4)^{2019}$

Άρα  $g(x) = (h \circ f)(x) = (x + 4)^{2017} + (x + 4)^{2019}$  με πεδίο ορισμού  $A = [-4, -3]$

**B3. (α)** Για κάθε  $x_1, x_2 \in A$  με  $x_1 < x_2$  έχουμε

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 + 4 < x_2 + 4 \Rightarrow (x_1 + 4)^{2017} < (x_2 + 4)^{2017} \quad (1)$$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 + 4 < x_2 + 4 \Rightarrow (x_1 + 4)^{2019} < (x_2 + 4)^{2019} \quad (2)$$

Με πρόσθεση των (1) και (2) προκύπτει:  $g(x_1) < g(x_2)$  επομένως η  $g$  γνησίως αύξουσα στο  $A$

Η  $g$  συνεχής ως πολυωνυμική στο  $A = [-4, -3]$  και γνησίως αύξουσα σε αυτό επομένως

$$g(A) = [g(-4), g(-3)] = [0, 2]$$

διότι:

$$g(-4) = (-4 + 4)^{2017} + (-4 + 4)^{2019} = 0$$

και

$$g(-3) = (-3 + 4)^{2017} + (-3 + 4)^{2019} = 1 + 1 = 2$$

**(β) Α-τρόπος**

Η εξίσωση  $2018 \cdot g(x) - 2035 = 0$  είναι ισοδύναμη με  $g(x) = \frac{2035}{2018}$

Ο αριθμός  $\frac{2035}{2018}$  είναι θετικός και μικρότερος του 2 άρα ανήκει στο σύνολο

τιμών της  $g$ , επομένως θα υπάρχει  $x_0 \in A$  ώστε  $g(x_0) = \frac{2018}{2035}$ , το  $x_0$  μοναδικό

διότι η  $g$  είναι γνησίως αύξουσα.

**Β-τρόπος**

Θεωρούμε τη συνάρτηση  $\varphi(x) = 2018 \cdot g(x) - 2035, x \in [-4, -3]$  η οποία είναι συνεχής στο  $[-4, -3]$

$$\text{Επίσης } \varphi(-4) = -2035$$

$$\text{και } \varphi(-3) = 2018 \cdot g(-3) - 2035 = 2018 \cdot 2 - 2035 = 2036 - 2035 = 1$$

δηλαδή  $\varphi(-4) \cdot \varphi(-3) < 0$  άρα από θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον  $x_0 \in (-4, -3)$  τέτοιο ώστε  $\varphi(x_0) = 0$

Για κάθε  $x_1, x_2 \in [-4, -3]$  με  $x_1 < x_2$

$$x_1 < x_2 \stackrel{g^1}{\Rightarrow} g(x_1) < g(x_2) \Rightarrow 2035 \cdot g(x_1) < 2035 \cdot g(x_2)$$

$$\Leftrightarrow 2018 \cdot g(x_1) - 2035 < 2018 \cdot g(x_2) - 2035 \Leftrightarrow \varphi(x_1) < \varphi(x_2)$$

Άρα η  $\varphi$  είναι γνησίως αύξουσα άρα το  $x_0$  μοναδικό.

**B4**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\eta\mu f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\eta\mu(x+4)}{(x+4)^{2017} + (x+4)^{2019}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\eta\mu(x+4)}{(x+4) \left[ (x+4)^{2016} + (x+4)^{2018} \right]} \\ &= \lim_{x \rightarrow -4} \left[ \frac{\eta\mu(x+4)}{(x+4)} \cdot \frac{1}{(x+4)^{2016} + (x+4)^{2018}} \right] = +\infty \end{aligned}$$

$$\text{διότι: } \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\eta\mu(x+4)^{(*)}}{x+4} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{u} = 1,$$

$$(*) \text{ θέτοντας } u = x+4 \text{ άρα } u_0 = \lim_{x \rightarrow -4} u = \lim_{x \rightarrow -4} (x+4) = 0$$

Επίσης

$$\lim_{x \rightarrow -4} \left[ (x+4)^{2016} + (x+4)^{2018} \right] = 0$$

και  $\left[ (x+4)^{2016} + (x+4)^{2018} \right] > 0$  κοντά στο  $-4$

άρα

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{1}{(x+4)^{2016} + (x+4)^{2018}} = +\infty$$

**ΘΕΜΑ Γ**

**Γ1.** Από τη σχέση  $f^2(x) - 2f(x) = e^{2x} + 2e^x$  η οποία ισχύει για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  έχουμε:

$$f^2(x) - 2f(x) = e^{2x} + 2e^x \Leftrightarrow f^2(x) - 2f(x) + 1 = e^{2x} + 2e^x + 1$$

$$\Leftrightarrow (f(x) - 1)^2 = (e^x + 1)^2 \Leftrightarrow |f(x) - 1| = |e^x + 1| \Leftrightarrow |f(x) - 1| = e^x + 1$$

Θεωρούμε  $h(x) = f(x) - 1$  άρα η τελευταία ισότητα γίνεται  $|h(x)| = e^x + 1$

$h(x) = 0 \Leftrightarrow |h(x)| = 0 \Leftrightarrow e^x + 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = -1$  αδύνατη επομένως  $h(x) \neq 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  και επειδή η  $h$  συνεχής ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων θα διατηρεί σταθερό πρόσημο στο  $\mathbb{R}$

$h(0) = f(0) - 1 > 0$  άρα  $h(x) > 0$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  οπότε

$$|h(x)| = e^x + 1 \Leftrightarrow h(x) = e^x + 1 \Leftrightarrow f(x) - 1 = e^x + 1 \Leftrightarrow f(x) = e^x + 2$$

**Γ2. (α)** Θεωρούμε τη συνάρτηση  $\varphi(x) = e^x + 4x, x \in \mathbb{R}$  η οποία είναι γνησίως αύξουσα διότι για κάθε  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  με

$$x_1 < x_2 \text{ έχουμε: } \begin{cases} x_1 < x_2 \\ x_1 < x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^{x_1} < e^{x_2} \quad (+) \\ 4x_1 < 4x_2 \end{cases} \Rightarrow \varphi(x_1) < \varphi(x_2)$$

Η  $\varphi$  συνεχής και γνησίως αύξουσα στο  $\mathbb{R}$  επομένως το σύνολο τιμών της είναι

$$\varphi(\mathbb{R}) = \left( \lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) \right) = (-\infty, +\infty)$$

διότι:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + 4x) = 0 + (-\infty) = -\infty$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 4x) = (+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

Ο αριθμός  $\lambda \in \mathbb{R}$  ανήκει στο σύνολο τιμών της συνάρτησης  $\varphi$  οποιαδήποτε και αν είναι η τιμή του επομένως υπάρχει πάντα  $x_0 \in \mathbb{R}$  ώστε  $\varphi(x_0) = \lambda$ , το  $x_0$  θα είναι μοναδικό διότι η  $\varphi$  είναι γνησίως αύξουσα.

Επομένως η εξίσωση  $e^x + 4x = \lambda$  έχει μοναδική ρίζα στο  $\mathbb{R}$  για κάθε τιμή της παραμέτρου  $\lambda \in \mathbb{R}$

(β) Έστω  $A(\alpha, f(\alpha))$  και  $B(\beta, g(\beta))$  σημεία των γραφικών παραστάσεων  $f, g$  αντίστοιχα.

Η εξίσωση εφαπτομένης της  $f$  στο  $A$  είναι:

$$(\varepsilon_1): y - f(\alpha) = f'(\alpha)(x - \alpha) \Leftrightarrow y = f'(\alpha)x - \alpha f'(\alpha) + f(\alpha)$$

Η εξίσωση εφαπτομένης της  $g$  στο  $B$  είναι:

$$(\varepsilon_2): y - g(\beta) = g'(\beta)(x - \beta) \Leftrightarrow y = g'(\beta)x - \beta g'(\beta) + g(\beta)$$

Για να έχουν κοινή εφαπτομένη πρέπει οι ευθείες  $(\varepsilon_1), (\varepsilon_2)$  να ταυτίζονται δηλαδή

$$f'(\alpha) = g'(\beta) \text{ και } -\alpha \cdot f'(\alpha) + f(\alpha) = -\beta \cdot g'(\beta) + g(\beta) .$$

Από τη σχέση  $f'(\alpha) = g'(\beta)$  παίρνουμε

$$f'(\alpha) = g'(\beta) \Leftrightarrow e^\alpha = -2\beta \Leftrightarrow \beta = -\frac{e^\alpha}{2} \quad (1)$$

$$-\alpha \cdot f'(\alpha) + f(\alpha) = -\beta \cdot g'(\beta) + g(\beta) \Leftrightarrow -\alpha e^\alpha + e^\alpha + 2 = -\beta(-2\beta) - \beta^2 + 2$$

$$\Leftrightarrow -\alpha e^\alpha + e^\alpha = \beta^2 \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} -\alpha e^\alpha + e^\alpha = \left(-\frac{e^\alpha}{2}\right)^2 \Leftrightarrow -\alpha e^\alpha + e^\alpha = \frac{e^{2\alpha}}{4} \Leftrightarrow -\alpha + 1 = \frac{e^\alpha}{4}$$

$$\Leftrightarrow e^\alpha = -4\alpha + 4 \Leftrightarrow e^\alpha + 4\alpha = 4$$

Η τελευταία εξίσωση έχει μοναδική ρίζα **(Γ2(α))** για κάθε  $\alpha \in \mathbb{R}$  άρα υπάρχει και μοναδικό  $\beta \in \mathbb{R}$  ώστε  $\beta = -\frac{e^\alpha}{2}$  επομένως οι συναρτήσεις  $f, g$  έχουν μόνο μια κοινή εφαπτομένη.

**Γ3.**

$$f(x^2) - f(-x+2) > 4g(x) - 4x \Leftrightarrow e^{x^2} + 2 - (e^{-x+2} + 2) > 4(-x^2 + 2) - 4x$$

$$\Leftrightarrow e^{x^2} + 4x^2 > e^{-x+2} + 4(-x+2) \Leftrightarrow \varphi(x^2) > \varphi(-x+2) \Leftrightarrow x^2 > -x+2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + x - 2 > 0 \Leftrightarrow x < -2 \text{ ή } x > 1$$

**Γ4.**  $y_1(t) = e^{x(t)} + 2$  **άρα**  $y_1'(t) = e^{x(t)} \cdot x'(t)$

$$y_2(t) = -x^2(t) + 2 \text{ **άρα** } y_2'(t) = -2 \cdot x(t) \cdot x'(t)$$

Ισχύει  $x'(t) = 1 \text{ cm / sec}$

$$y_1'(t) = 2y_2'(t) + 1 \Leftrightarrow e^{x(t)} \cdot x'(t) = 2(-2 \cdot x(t) \cdot x'(t)) + 1$$

$$\Leftrightarrow e^{x(t)} = -4x(t) + 1 \Leftrightarrow e^{x(t)} + 4x(t) = 1 \Leftrightarrow \varphi(x(t)) = 0 \Leftrightarrow \varphi(x(t)) = \varphi(0) \Leftrightarrow x(t) = 0$$

Άρα στο σημείο  $A(0, f(0))$  για την  $f$  και στο σημείο  $B(0, g(0))$  για την  $g$  ισχύει

$$y_1'(t) = 2y_2'(t) + 1 \text{ δηλαδή στα σημεία } A(0, 3) \text{ και } B(0, 2)$$

**ΘΕΜΑ Δ**

**Δ1. (α)** Θεωρούμε τη συνάρτηση  $h(x) = \frac{f(x) - 1}{x - 1}, x \neq 1$  (1) με  $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2$

Από τη σχέση (1) έχουμε  $f(x) = h(x)(x - 1) + 1$  άρα

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} [h(x)(x - 1) + 1] \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 \text{ και επειδή η συνάρτηση } f$$

είναι πολυωνυμική συνάρτηση ορισμένη στο  $\mathbb{R}$  θα είναι συνεχής επομένως

$$f(1) = 1$$

**(β)** Η  $f$  παραγωγίσιμη στο  $\mathbb{R}$  ως πολυωνυμική επομένως

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \stackrel{f(1)=1}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{x - 1} = 2$$

**Δ2.** Ισχύει  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2 + 1} = 1$  (2)

Έστω  $f(x) = \alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_0$ ,  $\alpha_v \neq 0, v \in \mathbb{N}$

τότε  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha_v x^v + \alpha_{v-1} x^{v-1} + \dots + \alpha_0}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha_v x^v}{x^2}$  έχουμε τις εξής περιπτώσεις

Αν  $v > 2$  τότε  $\alpha_v \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{v-2} = \begin{cases} +\infty, \alpha_v > 0 \\ \text{ή} \\ -\infty, \alpha_v < 0 \end{cases}$  σε κάθε περίπτωση άτοπο λόγω της (2)

Αν  $0 \leq v < 2$  τότε  $\alpha_v \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{2-v}} = 0$  άτοπο λόγω της (2)

Άρα  $v = 2$  δηλαδή η  $f$  είναι πολυωνυμική συνάρτηση 2<sup>ου</sup> βαθμού οπότε

$f(x) = ax^2 + bx + \gamma$  επομένως  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2}{x^2 + 1} = a$  και λόγω της (2)

έχουμε  $a = 1$

Άρα  $f(x) = x^2 + bx + \gamma$  από τις σχέσεις  $f(1) = 1$  και  $f'(1) = 2$  έχουμε:

$$f(1) = 1 \Leftrightarrow 1 + \beta + \gamma = 1 \Leftrightarrow \beta + \gamma = 0$$

Η  $f$  παραγωγίσιμη με  $f'(x) = 2x + \beta$  οπότε:

$$f'(1) = 2 \Leftrightarrow 2 + \beta = 2 \Leftrightarrow \beta = 0 \text{ άρα και } \gamma = 0 \text{ οπότε } f(x) = x^2$$

**Δ3.** Η συνάρτηση  $f(x) = x^2$  έχει ελάχιστο στη θέση  $x = 0$  με τιμή  $f(0) = 0$  ενώ η συνάρτηση  $g$  έχει ελάχιστο στη θέση  $x = a$  με  $a > 0$  με τιμή  $g(a) = 0$

Για να δείξουμε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων  $f, g$  έχουν ένα τουλάχιστον κοινό σημείο αρκεί να δείξουμε ότι η εξίσωση  $f(x) = g(x)$  έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα  $(0, a)$

Θεωρούμε τη συνάρτηση  $h(x) = f(x) - g(x) \Leftrightarrow h(x) = x^2 - g(x)$

Η  $h$  συνεχής στο διάστημα  $[0, a]$



$$h(0) = -g(0) < 0$$

διότι εφόσον η  $g$  έχει ελάχιστο  $g(x) \geq g(\alpha)$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$  δηλαδή  $g(x) \geq 0$  και το ίσον ισχύει μόνο για  $x = \alpha$  άρα  $g(0) > 0 \Leftrightarrow -g(0) < 0$

$$h(\alpha) = \alpha^2 - g(\alpha) = \alpha^2 > 0 \text{ εφόσον } \alpha \neq 0$$

Δηλαδή  $h(0) \cdot h(\alpha) < 0$  άρα από θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον  $x_0 \in (0, \alpha)$  ώστε  $h(x_0) = 0 \Leftrightarrow f(x_0) = g(x_0)$

Δ4. Έχουμε ότι  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(g(x_0)+h) - g(g(x_0)-h)}{2h} = g'(\eta\mu g(x_0))$

$$\Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(g(x_0)+h) + g(g(x_0)) - g(g(x_0)) - g(g(x_0)-h)}{2h} = g'(\eta\mu g(x_0))$$

$$\Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{g(g(x_0)+h) - g(g(x_0))}{2h} + \frac{g(g(x_0)-h) - g(g(x_0))}{2h} \right] = g'(\eta\mu(g(x_0)))$$


$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{g(g(x_0)+h) - g(g(x_0))}{h} + \frac{g(g(x_0)-h) - g(g(x_0))}{h} \right] = g'(\eta\mu(g(x_0))) \quad (A)$$

Για το  $\frac{g(g(x_0)+h) - g(g(x_0))}{h}$  θέτουμε  $u = g(x_0) + h$  άρα

$$\lim_{u \rightarrow g(x_0)} \frac{g(u) - g(g(x_0))}{u - g(x_0)} = g'(g(x_0))$$

Για το  $\frac{g(g(x_0)-h) - g(g(x_0))}{h}$  θέτουμε  $u = g(x_0) - h$  άρα

$$\lim_{u \rightarrow g(x_0)} \frac{g(u) - g(g(x_0))}{-u + g(x_0)} = - \lim_{u \rightarrow g(x_0)} \frac{g(u) - g(g(x_0))}{u - g(x_0)} = -g'(g(x_0))$$



Άρα η σχέση (Α) γίνεται

$$\frac{1}{2}(g'(g(x_0)) + g'(g(x_0))) = g'(\eta\mu g(x_0)) \Leftrightarrow g'(g(x_0)) = g'(\eta\mu g(x_0))$$

Αν η συνάρτηση  $g'$  είναι αντιστρέψιμη τότε  $g(x_0) = \eta\mu g(x_0) \Leftrightarrow g(x_0) = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow x_0^2 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 0 \text{ άτοπο διότι } x_0 \in (0, \alpha)$$

ΚΟΡΥΦΗ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ